

Intubeaze®

Uma pulverização rápida
facilita a intubação.

Os gatos podem ser difíceis de intubar.

**A sua laringe é sensível e podem ser propensos
ao laringoespasma, o que pode fazer com que a
intubação seja muito complicada e até provocar
uma obstrução respiratória.**

O Intubeaze contém lidocaína para aplicação tópica em forma de pulverização laringo-faríngea. O seu aplicador, especialmente desenhado, permite uma administração rápida e fácil, com a confiança de administrar uma dose precisa de lidocaína.

pixie



Intubeaze facilita a intubação endotraqueal

- Proporciona anestesia local na mucosa da laringe
- Impede a estimulação do reflexo laríngeo e reduz o risco de laringoespasma
- Garante que se administra sempre uma dose previsível e precisa

Desenvolvido especificamente para gatos

- O aplicador é fácil de utilizar e tem a forma ideal para gatos
- Cada pulverização contém 2,8 mg de lidocaína cloridrato monohidrato (2,27 mg de lidocaína), permitindo calcular facilmente a dose total de lidocaína
- Simplesmente aplique 1 ou 2 pulverizações na laringe
- Espere 30-90 segundos para permitir que a laringe esteja relaxada para a intubação

Conveniente

- Frascos de 10 ml
- O aplicador pode ser facilmente removido para limpeza
- Proporciona uma pulverização exata e com um padrão consistente
- Aproximadamente 72 vaporizações por embalagem
- Pode ser utilizado até 3 meses após a abertura

Intubeaze 20 mg/ml spray laringofaríngeo, solução para gatos. Cada ml contém: Cloridrato de lidocaína monohidratado 20 mg (equivalente a lidocaína 16,2 mg) Cada impulso (0,14 ml) contém 2,8 mg de cloridrato de lidocaína monohidratado, o que corresponde a 2,27 mg de lidocaína. Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo: Felinos (Gatos). Anestesia local da mucosa laringea do gato para facilitar a intubação endotraqueal, evitando assim a estimulação do reflexo laríngeo. Contra-indicações: Não administrar a animais hipovolémicos ou que apresentem bloqueio cardíaco. Não administrar em caso de conhecida hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Advertências especiais <para cada espécie-alvo>: O espasmo laríngeo também pode ser estimulado através da remoção do tubo endotraqueal. Isto deve ser levado a cabo enquanto o paciente se encontrar anestesiado. Reações adversas (frequência e gravidade): Não existem dados disponíveis. Intervalo(s) de segurança: Não aplicável. Titular da autorização de introdução no mercado: Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Países Baixos. Número da autorização de introdução no mercado: 1215/01/18DFVPT