

# NOVO

TRAMADOL  
com registo veterinário

## TRALIEVE®

Tramadol em comprimidos de 20 e 80 mg para cães





# Tralieve® comprimidos de 20 e 80 mg

- **Indicações de utilização em cães:** Redução da dor aguda e crónica de intensidade leve ao nível de tecidos moles e sistema musculoesquelético
- **Para a gestão em casa da dor aguda ou crónica,** como parte de um programa de analgesia multimodal














## Posologia

- **2-4 mg/kg** de cloridrato de tramadol
- Administrar cada 8 horas ou segundo for necessário, dependendo da intensidade da dor
- Intervalar as doses num mínimo de 6 horas

## Comprimidos de 20 e 80 mg

- **2 apresentações** para adaptar o tratamento a qualquer paciente
- **Comprimidos fracionáveis em quartos** para uma dosagem precisa e flexível
- **Comprimidos com sabor** a frango para facilitar a administração
- O alimento não afeta a absorção
- Embalagens com 3 blisters de 10 comprimidos

## Dosagem de Tralieve® comprimidos a 4 mg/kg

Peso do cão	Tralieve® 20 mg	Tralieve® 80 mg
1,25 kg		
2,5 kg		
3,75 kg		
5 kg		
6,25 kg		
7,5 kg		
10 kg		
15 kg		
20 kg		
30 kg		
40 kg		
50 kg		
60 kg		



Conservação das frações de comprimidos: 3 dias

18/19-CAP-015PT  
**Tralieve® 20 mg e Tralieve® 80 mg comprimidos para mastigar para cães.** **Composição:** Um comprimido de Tralieve® 20 mg contém: Cloridrato de tramadol 20 mg (equivalente a 17,6 mg de tramadol). Um comprimido de Tralieve® 80 mg contém: Cloridrato de tramadol 80 mg (equivalente a 70,3 mg de tramadol). **Indicações:** Caninos (cães). Para diminuição da dor aguda e crónica ligeira musculoesquelética e dos tecidos moles. **Contraindicações:** Não administrar juntamente com antidepressores tricíclicos, inibidores da monoamina oxidase e inibidores da recaptação da serotonina. Não administrar em caso de hipersensibilidade ao tramadol ou a algum dos excipientes. Não administrar a animais com epilepsia. **Reações adversas:** Podem ocorrer frequentemente sedação e sonolência ligeiras, especialmente quando se administram doses mais elevadas. Observaram-se casos pouco frequentes de náuseas e vômitos em cães após a administração de tramadol. Em casos raros pode ocorrer hipersensibilidade. No caso de reações de hipersensibilidade, o tratamento deve ser descontinuado. Em casos muito raros, o tramadol pode induzir convulsões em cães que têm um limiar convulsivo baixo. **Apresentações:** Caixa de cartão de 3 blisters de 10 comprimidos. **Titular da autorização de introdução no mercado:** Le Vet Beheer B.V. - Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater - Países baixos. **Número(s) da autorização de introdução no mercado:** Tralieve® 20 mg: 1185/01/18DFVPT / Tralieve® 80 mg: 1185/02/18DFVPT.